

別表 1

方法	抗体価
HI 法	32 倍
EIA 法	使用する検査キットがウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG (デンカ生研株式会社) の場合、 EIA 価 8.0
	使用する検査キットがエンザイグノスト B 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社) の場合、 30 IU/mL
ELFA 法	使用する検査キットがバイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・バイオメリュー株式会社) の場合、 45 IU/mL
LTI 法	使用する検査キットがランピア ラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社) の場合、 30 IU/mL
	使用する検査キットがランピア ラテックス RUBELLA II (極東製薬工業株式会社) の場合、 35 IU/mL
CLEIA 法	使用する検査キットがアクセス ルベラ IgG (バックマン・コールター株式会社) の場合、 45 IU/mL
	使用する検査キットが i-アッセイ CL 風疹 IgG (株式会社保健科学西日本) の場合、 抗体価 14
CLIA 法	使用する検査キットが Rubella-G アボット (アボットジャパン株式会社) の場合、 25 IU/mL
FIA 法	使用する検査キットが BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社) の場合、 抗体価 AI* 3.0
	使用する検査キットが BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社) の場合、 30 IU/mL

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位

※ 平成 26 年 2 月 25 日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「予防接種が推奨される風しん抗体価について」を参考。